

15593

~~IV. 2. 11~~
NA 3

7521. In French, on paper : written about 1841
by Jean Louis Berlandier : $8\frac{1}{4} \times 6\frac{3}{8}$ in., 48
pages.

'Notes pour servir à l'histoire de la première invasion de la fièvre jaune dans la ville de Matamoros, departem^t de Tamaulipas (republique Mexicaine). écrites sur les lieux par J. Louis Berlandier.' The date, '1841, Oct^e. Nov^e. Dec^e.', is that of the epidemic, of which this is a systematic account. 10 pp. are blank.

Phillipps MS. 15593.

FROM
THE LIBRARY
OF
SIR WILLIAM OSLER, BART.
OXFORD

7521

1841
Sep.^r Oct.^r
Nov.^r


876.
1019

Notes pour servir à
l'histoire de la première insa-
-sion de la fièvre jaune dans
la ville de Matamoros, départem^t
de Tamaulipas ~~et de~~ (république
Mexicaine).

écrites sur les lieux
par.

J. Louis Berlandier.

Phillipps Ind
15593



13


Accoutumé à noter pour mon
propre usage tous les phénomènes
remarquables que m'offre la nature
j'ai cru de mon devoir de ne pas
laisser dans l'oubli de prendre quelq^s
notes relatives à une maladie endemi-
que dans des régions lointaines où
souvent on ne peut recueillir que des
observations éparses qui ^{mais} par leur réunion
sont tôt ou tard utiles à la science.
Si l'étude de l'histoire naturelle mérite
l'attention des hommes éclairés et des
gouvernements par l'utilité que l'on
en retire, par son application à une
suite de circonstances journalières
ava bien plus de raison, le voyageur
observateur doit-il tracer une esquis-
se des phénomènes qui se présentent
lorsqu'un fleau de cette nature s'appa-
roît dans quelque population pour
la première fois. Je suis parti à
croire que ces memoranda historici
non seulement utiles aux populations
se sont à la société en général, et à
l'espèce humaine en particulier. — Si

nous jettons un coup d'œil sur
l'histoire des différentes maladies
qui nous affligent, peu d'auteurs nous
ont décrit leur première apparition
et nous si avons qu'une idée confuse
de ce qu'elle était au sortir de son
berceau. Cependant ces notes ont
manqué à la science et qui sait
si avec ces connoissances le génie
de l'homme n'aurait opposé une
résistance au moins, une barrière
peut être, à ces cas fortuits qui s'em-
blent des révolutions de l'état sa-
nitaire, à peu près de la même
manière que les volcans et les trem-
blemens de terre qui à des époques
imprévues viennent tout bouleverser
sur des continents ou tout en silence
la nature marchant en paix pa-
roissait suivre les lois ordinaires
de l'existence.


J'ai réuni dans ces notes tout
ce qui selon moi pouvait intéres-
ser le législateur, le philosophe et
le médecin. Sans aucune préoccupa-
tion, sans aucune théorie à soutenir

5
on y trouvera des observations utiles
peut être aux contagionistes et à leurs
adversaires, je n'ai nullement cherché
à dénaturer les faits que j'ai désiré pré-
senter d'après des influences étran-
gères. Mon intention n'a pas été de
faire une histoire de la fièvre jaune
je n'ai voulu que rapporter ce que j'ai
vu, ce qui s'est passé et ce que tous les
habitans du pays affligé ont vu par
eux-mêmes.

Sur le rapport d'anciens créoles de
la Louisiane j'ai tracé une esquisse
bien incomplète de la manière que la
fièvre jaune y apparut, lorsqu'on ne
la connoissoit pas, et par cette courte
narration l'on verra que là aussi la
première apparition de la première
fièvre jaune ne diffère pas de ce qu'elle
est de nos jours quand elle attaque une
population pour la première fois.



7




1841.

Appari-
tion.

L'apparition de la fièvre jaune pour la première fois dans la ville de Batavia et les côtes du Mexique par les 25° 53' de latitude septentrionale, n'a surpris que les courants peu observateurs et étrangers qui annonçoient de telles pestes que l'on n'avoit été en et exemple de se fier. Les circonstances locales qui se présentèrent alors, étoient sans doute très-étranges de plusieurs fait, mais, rassemblée à bord, il y eut un ravage si vite qui ne sermoit qu'un bannissement ^{et} la population manquoit pour s'en débarrasser, comme de le voir plus tard. Il est même très probable que si on eût toutes les clés au colosse, on eût vuient de populations plus ou moins considérables. Le typhus a été très-rare, comme à l'ordinaire et à la suite de la fièvre. On ne trouve aucune circonstance qui indiquât un déplacement de ces épidémies et de la fièvre en elle-même et de la fièvre que la population eût souffert entre les limites ou de se débarrasser la maladie. Les malades se rapprochoient au point que l'on n'eût pu

est endémique Sans ce port du Yucatan
mais que les cas y sont fort ^{communs} et seulement
d'n'y attaque que les étrangers. Ce qui me
porterait à croire cette assertion c'est que
le résidu d'un bataillon de ces indigènes qui
se composait d'environ 150 soldats, tous
défilèrent la maladie qui envahissait géné-
ralement tous les soldats des corps de
l'intérieur du Mexique. A Tampico la
fièvre jaune a apparu quelquefois, a été
la Marina en 182 une épidémie anale-
que ~~non~~ s'y fit de grands ravages et je
puis porter à y croire quelle fut de même
nature: enfin, lors que la fièvre jaune avait
cessé a Matamoras, quelques cas isolés
se présentèrent dans le grand bourg de
San Fernando situé à 36 lieues plus
dans l'intérieur. Si ce triste fleuve de présente
donc, sur les rives du golfe Mexicain
partout ou la population augmente et
dans certaines circonstances qui quelque
existances n'ont pas encore été bien étudiées,
pourquoi cette maladie ne sera pas même
quelque dans tous ces ravages, pourquoi ne
s'établira-t-elle pas, sur la vaste étendue des
plages Mexicaines encore désertes lorsque

un grand nombre d'individus y d'ont
agglomérés? Avant que la Nouvelle Orléans
fut si peuplée, avant qu'un grand nombre
d'Européens s'y fussent établis à Veracruz
on n'y voyait pas ce lieu. Lorsque
Tamayo n'était qu'un hameau de pêcheurs
le climat y étoit plus sain, lors même qu'on
voyait Viejo situé dans un bas ^{fond} à peine
à un mille de distance, mais plus peuplé
on observait souvent des maladies endémiques
et peut-être celle qui nous occupe, que l'on
y a récemment vu obscur, qui depuis
l'indépendance.



fièvre jaune

La fièvre jaune ce fleau terrible qui
quelques fois sort de ses limites naturelles
est ^{endémique} habituellement sur les côtes du golfe
du Mexique où il règne plus ou moins
tous les ans. Les habitants de la petite
ville de Matamoros s'attendaient qu'il n'y avait
cette maladie n'arriverait dans leur
pays, vivait dans la plus parfaite
sécurité jusqu'en 1841 et ce fut
sous la première épidémie. Quelques médecins
bien atteints et un grand nombre d'in-
dividus moururent la présence de cette
épidémie, ce qui contribua d'abord
à troubler la population. Le premier
cas notable que l'on vit, fut celui
d'un homme qui vivait au centre de
la ville, qui tomba malade le 26
et mourut, dont la maladie dura huit jours
et qui plus tard eut une grave rechute
qui faillit le conduire au tombeau. Avant
cette époque un grand nombre de per-
sonnes de la population tombèrent ma-
lades et moururent à cinq jours, pendant que
de nombreuses personnes d'une fièvre
plus ou moins grave sans jamais s'écarter

aucun cas de mortelle. C'est ceux qui
je ne souffris de cette indisposition joui-
rent d'une parfaite santé lors de l'écou-
pée qui déclara. Les premiers victimes
qui par leur rang et leurs relations jette-
rent l'épouvante, furent les vics conseillers
d'Angleterre et de Prusse qui le premier
12 du même mois succombèrent violemment.
Dans les premiers périodes de la maladie.
L'un et l'autre, mais surtout le dernier
offroient sur leur cadavre, cette couleur
jaune de toute la peau, ces taches plombées
autour des yeux et du col et ces saignements
d'anciens des hémorrhagies buccales. Dès
lors, il ne fut plus possible de cacher la
nature du mal, les cas se succédèrent
et la mortalité commença. A l'hôpital
militaire, la nuit du 16 mourut le
tambour-major du bataillon des sapeurs
du génie avec tous les caractères bien dé-
veloppés de cette maladie qui chez lui
ne dura que six jours. Le chirurgien
en chef de l'hôpital, mon ami Dr. Ma-
rini Ortega, et moi nous vîmes alors
plusieurs cas presque foudroyants qui

conduiraient les malades en peu de temps
à la tombe. Ce fut à cette époque que
vint un malheureux soldat qui ne s'aper-
çut que quelques heures avant la pulsation
avait baissé tout d'un coup, à 32 et 27
battements par minutes.

La marche de la maladie fut assez re-
marquable. Attribuée à l'arrivée d'une go-
lette récemment venue de la Nouvelle Or-
léans qui perdit dans le port deux matelots,
elle se développa dans le centre de la population
dans des maisons dont les habitants n'avoient
en aucune relation avec les nouveaux-arrivés.
Là où elle commençait elle ne cessait ses rava-
ges que lorsqu'elle ne trouvoit plus de vic-
times et l'on peut même dire qu'elle n'a res-
pecté personne, excepté les créoles de la
Louisiane, de la Havanne, de Tampico, de
Veracruz, de Yucatan et d'autres localités
où cette maladie est endémique, ainsi que
les individus qui quoique étrangers en avoient
été affectés. J'ai cherché en vain, un Louisia-
nois ou un Veracruzano malade, tout devoient
s'être guéris. Au contraire les autochtones
et les indigènes qui n'avoient jamais été affectés
de cette cruelle maladie, presque tous furent

plus ou moins malades. Chez eux la
fièvre jaune n'offroit qu'un petit nombre
de symptômes alarmans, généralement
soins, la mortalité ne fut notable que dans la
classe indigente ou chez ces individus indo-
ciles aux conseils de leur médecin. Parmi
les étrangers et surtout les individus adonnés
aux boissons spiritueuses la maladie fut
plus grave et la mortalité plus considérable.
Les Italiens qui sont nombreux dans cette
ville, les Espagnols qui s'y trouvent en
grand nombre, les Français, etc. furent
généralement bien moins malades que
les Allemands, les Anglais, les Américains
et les Irlandais, etc. qui proportionnellement
furent bien plus mal traités. Les enfans
même en tout cas âgés comme les adultes
payèrent leur tribut. Quoique ces individus
des deux sexes aient été également atteints,
on a observé que les femmes en général
l'ont été moins que les hommes et que
les cas graves ainsi que les cas de morta-
lité ont été bien moins nombreux chez
le sexe féminin.


Cette cruelle épidémie ne commença
à diminuer de violence que vers la fin

du mois de novembre. Elle dura
par conséquent près de deux-mois
et demi et enleva à nos amores
habitants. Il ne vult pas d'observer que la
mortalité a été presque absolue chez
tous les individus du Mexique nés dans
l'intérieur des montagnes qui par
hasard venoient dans cette ville. On
voyoit les mulâtres arrivés bien por-
tants de l'intérieur, tomber succes-
sivement malades pour ne plus avoir
leurs foyers. Cette bizarre maladie se
présentoit sous de fréquents aspects: cepen-
dant un caractère, symptôme malade
que j'ai observé chez tous les malades
était la céphalgie, les douleurs de cein-
ture, et l'état fébrile la premier
période. Les changements de tempe-
rature eurent peu d'influence sur
cette fièvre. En d'octobre, le so-
leil étoit très-chaud et le ha-
leur commençait; il ne tomba pas
une goutte de pluie, les vents au sud
furent faibles ou rares, mais le 24
novembre ayant commencé à souffler
un vent le N-E et, le 28. un

son ciel bleu d'azur conduisant le
même vent, la température ayant
baisse au lever du soleil jusqu'à 0° .
Les plantes ayant se gelées, et le ther-
momètre ne s'est élevé à midi qu'à
 46° fahr () L'état sanitaire
ne s'améliora point. Le 29, dans la
nuit le thermomètre baissa encore
à 31° fahr (-0°) et cependant le
30, le vent de N.E. ayant repris, le
ciel étant nubuleux on observoit encore
de nouveaux cas. Durant quinze jours
encore à chaque variation de tempe-
rature on espéroit voir diminuer la
maladie, mais en vain. Les cas étoient
plus rare, parceque presque tous les
habitans avoient passé cette dure
épreuve, ou n'étoient pas disposés
à en être affectés. On peut prouver
ce fait, parce qu'à cette époque, quelq^s
individus venant de l'intérieur, pour
voir les fêtes qui ne se verifioient
qu'en Janvier tombèrent gravement
malades.

Des anciens écoles de la Louisia-
ne, le moins oculaires des premières

19
invasions du typhus d'Amérique.
à la fois le typhus est le typhus
car la même maladie à Matamoros
m'ont assuré qu'elle s'y présente avec
les mêmes nuances, avec la même
benignité et de la même manière. Les
cas graves furent aussi rares parmi
les créoles, mais la maladie sevit avec
force chez les étrangers non acclimatés.
A Matamoros où la population
renée dans des foyers s'élevait tout
au plus à 8000 âmes, la mortalité
y comprise celle de la garnison
s'éleva durant cette époque fatale à
individus. Plusieurs étrangers
acclimatés dans les colonies malsai-
nes d'Amérique qui avaient échappé
à ce typhus, en furent atteints à
cette première apparition à Matam-
oros, m'assurant avoir souvent
vu au milieu des malades d'autres
sans en avoir été incommodés.



Chlorophyll and other green
pigments of the leaves.

Les deux autres sont destinés à servir de
 habitacle à des plantes et à des animaux
 qui y croissent et y vivent. Les deux autres
 sont destinés à servir de habitacle à des
 plantes et à des animaux qui y croissent
 et y vivent. Les deux autres sont destinés
 à servir de habitacle à des plantes et à
 des animaux qui y croissent et y vivent.

a small square of white paper
with the name of the subject and the
name of the person to whom it is addressed
written on it in ink. It is then
folded into a square and placed
in the envelope with the letter.

[illegible]

Existence d'un virus mortifique.

Les observations suivantes, toutes de la plus grande véracité, prouvent^{nt} que la fièvre jaune est due à un principe virulent qui ne se développe que dans des circonstances propres et dans le lieu infecté. Cependant de ces observations on peut déduire plusieurs conséquences sur les précautions sanitaires à prendre lorsque cette maladie s'est développée.

1°. On a observé que la fièvre jaune ne s'est nullement présentée dans les habitations et hameaux des environs. Il est vrai qu'il y a eu un assez grand nombre de malades, mais on a aussi remarqué que ceux qui ont été atteints de la fièvre jaune étoient précisément les individus qui par nécessité étoient venus dans la population infectée. Lors même qu'ils n'y avoient^{en} résidé que quelques heures. Les mêmes individus parmi lesquels plus succombèrent, s'infectèrent ni leurs parents, ni ceux qui en prirent soin ni les localités où ils succombèrent.

2°. Le virus parut s'étendre du centre de la ville à ses environs,

et la maladie fut d'autant plus
severe que les habitations étoient
plus élevées. Les gens de la campa-
gne, situés sur la route entre l'ém-
bouchure du Rio Bravo, le Bravo de
Santiago, où dit-on on observa ces
marins malades - aux quels on attribue
l'importation du mal et la ville de
Matamoros où elle se développa, n'ont
pas été plus atteints que ceux des ranchos
situés sur la route de Matamoros
à Reynosa où la maladie est restée
inconnue endémiquement. Dans quelques
ranchos il y a eu nombreux malades
mais la maladie a été moins grave,
et la mortalité presque insignifiante;
on peut même assurer d'après les in-
formations obtenues qu'aucun des in-
dividus malades qui n'étoient pas
venus à la ville ne sont morts. J'ai
connu plusieurs campagnards qui
s'étoient interdit l'approche de la popu-
lation durant la maladie, mais qui
ayant voulu s'y introduire parce qu'elle
n'y faisoit plus de ravages tombèrent
presque au même instant malades.

3.^o Durant l'insolation de la fièvre
comme j'ai observé, que toutes les sang-
sues appliquées aux malades mour-
aient sans bout de quatre jours, tandis
que celles appliquées pour d'autres
maladies survivaient et pouvaient ser-
vir plusieurs fois.

4.^o Au rancho (chaumière) de la
Jajama, située à environ 9 l. dans
le S.E. de la ville, un habitant de
Matamoros qui pour ses affaires con-
duisit dans les lieux, et tombe gravement
malade. Quelques personnes qui l'assis-
tent s'indisposent, il va mourir dans
la population et toute les parties
d'habitation qui ont mangé des matières
vomies ou rejetées par cet individu
moururent successivement.


5.^o Un chevreuil (*Cervus virginia-*
nus) bien portant en avait été un de
mes amis le cap^{te} Solariago, meurt
après une maladie d'environ deux jours
vomissant et rejetant par les selles des
matières noires et sanguinolentes. Dans
cette maison tout le monde étoit au lit
il n'y eut aucune mortalité mais plus
d'un dans le voisinage.

6^o Dans les moments les plus on-
goureux de la maladie le curé de
Matamoros M^r S. M. Rodriguez,
m'a rapporté qu'étant à confesser un
moribond qui vomissoit des matières
noires et sanguinolentes, entrèrent dans
la chaumière 3 ou 4 poules qui à
son insçu mangèrent des substances.
Quel fut la surprise, lorsque tout au-
près dix minutes après, ayant fini
la confession il trouva sur ses pas les
poules étendues mortes.

7^o Dans la maison que j'habito-
tai avoit succombé il y avoit environ
huit jours un vieillard sexagénaire
ses parents ayant fait laver les linges
contaminés des vomissements et des déjec-
tions de la maladie, les eaux s'étant
accumulées dans les bas fonds de la
cour, les poules et les canards vinrent
boire de cet eau. Les premières mou-
rurent presque toutes au nombre de
vingt-deux, tandis que cinq ou six
canards qui vivaient mêlés avec
elles ne furent pas atteints de la
maladie. Je pourrai citer au besoin plusieurs
autres cas analogues.

29
8.^o Pendant que régnait la fièvre
jaune plusieurs ^{chiens} appartenant à des person-
nes que je connoissois et qui n'étoient
pas malades, sont morts subitement et
quelques uns parmi ce nombre avec des
vomissements.





Observations contre la contagion
hors des limites du théâtre de la mala-
die.

J'ai porté toute mon attention j'ai cher-
ché à réunir tout ce qui peut intéresser
l'humanité.

10^e oct. 1821. Le courrier d'octobre
qui habituellement portait la corres-
pondance de Matamoros à Mier étoit un
homme acclimaté ^{les années} ni dans cette ville. Le
8^e Novembre il parut de la population in-
fectée, porta la correspondance et venant
de retour pour Matamoros, il tombe ma-
lade aux ranchos de nos voisins ^(19 nos 2)
entre Mier et Reynosa et y meurt, vomis-
sant le sang noir et rejetant par les
selles des substances noirâtres sanguinolentes.
Son corps est teint d'une couleur jaune
foncé après la mort. Aucun individu
de ceux qui le soignent, aucun de ceux
qui l'enterrent, ni les habitants du rancho
ressentent les effets de la maladie.

L'administrateur des courriers m'a-
sûre que les individus sus cités
point ont ^{touché} ~~touché~~ ^{aucunement} ~~aucunement~~ en portant la correspon-
dance, qui durant les moments les plus

dangereuse est conduite de bureau
en bureau, d'habitation en habitation
parce que les courriers étaient tous ^{hors de} ~~hors de~~
^{sejourner.} ~~hors de~~ Les hommes transitent et meu-
rent partout les relations épistolaires
ne sont point interrompues et cependant
la maladie ne se développe pas dans
les populations ébranlées.

A Matamoros, on observa que comme
sur toute la côte du Golfe, à Veracruz
comme à Tampico, les malades et
convalescents rencontrant des populations
hospitalières, sont forcés à résider dans
les localités où ils sont tombés malades
ils marchent vers l'intérieur. Ceux de
Veracruz vont à Salapaz, ceux de Tam-
pico à l'acheminement sur Saint Louis,
s'arrêtent à Santa Barbara ou à
Tula, là ^{ils} y meurent ou se rétablissent
et cependant se trouvant dans des régions
plus élevées et moins mal saines, ils
ne communiquent leur maladie à per-
sonne. On n'a pas un seul exemple de
puis que la fièvre jaune existe sur les
côtes du Mexique, qu'un seul individu

habitant les populations d'origine indienne
de la côte, ont été atteints de cette affection
au sein des ans des convalescents et des
malades y viennent chercher une meilleure
résidence. Si ces individus alloient à Tera
ou à Tampico, le cas serait différent
car ils pourraient avoir apporté le germe de
la maladie du lieu infecté. et ce cas d'in-
fection ne serait qu'un cas d'épidémie en-
démique. On n'a pu constater de cas
qui aient été infectés à Tampico
ou à Tera qui aient été infectés par les
habitants de ces lieux. On a pu constater
bien des cas infectés par d'autres individus
à l'exemple d'un individu qui de Tera
est venu à Tampico et a infecté à Tampico
un grand nombre d'individus dans le lieu
où les symptômes de la fièvre paraissent
dans toutes les maisons.

2^e Espèce de la fièvre. On a pu constater
cette fièvre au sein des individus qui
sont en convalescence malades. On a pu
constater à Tera et Tampico, et dans
les autres lieux où il y a des malades
par ceux qui convalescent et se infectent.

[illegible]

37
Les cas les plus fréquents de
fièvre jaune qui furent observés
durant l'épidémie de 1848.

A l'attention toute particulière
qui me portoit à l'étude de cette
maladie singulière m'indiqua
sur l'échantillon un si grand nombre
de mutations notables que je ne
tardai pas à les classer parmi ces
protées qui par leurs formes inconstantes
échappent à nos observations.
Sur plusieurs centaines de cas que
j'ai pu suivre dans la population
et même à l'hôpital militaire, on
peut assurer que si la fièvre jaune
a ses caractères généraux qui ten-
dent à réunir sous une même caté-
gorie ces cas variés aucun d'eux
ne ressemble à l'autre. On observe
ici ce que l'on observe dans toutes
les fièvres natives, c'est à dire
qu'une classe est touchée ou bien
déterminée, plus la nomenclature des
cas qui en ont partie, ou des divisions
qu'on leur impose est un chaos plus

obscur. Pour nous faire une idée
exacte de l'épidémie de cette époque
nous nous rappellerons ici que M^r
le doct^r Chabert qui a fait une étude
approfondie de la fièvre jaune, divise
les divers cas en six classes qu'il a
qualifiées de variées. Cette classifica-
tion assez naturelle, ne recunit pas
mal presque tous les cas de fièvre
jaune qui se présenteront alors, à
exception de ces cas rares de la même
maladie qui s'observeront consécuti-
vement avant que l'épidémie fut
mortelle, qui étaient à la fièvre jaun-
e que la cholérine était au choléra
mais avec cette différence que
l'indisposition ~~était~~ précédait de la
fièvre jaune, quoique de courte durée
et généralement sans danger. Et
cette époque, sans doute les émanations
infectes n'étaient pas encore com-
plètement développées et leur action
bien moins active. Comme la fièvre
jaune, cette affection se limitait à
une espèce de fièvre cérébrale, accompa-
gnée de vésicules frontales très an-
guës et de presque tous les autres

symptomés d'une fièvre bilieuse
dans son invasion. Dès que la mor-
talité commença à s'étendre ces
cas commencèrent à diminuer et
lorsque l'épidémie cessait, lorsque
les cas étoient fort rares, ils étoient
aussi tous très-dangereux.

Les cas de la première variété
décrite par M^r Chabert, tous plus
ou moins funestes, et où l'on observe
que les facultés intellectuelles sont
fortement altérées, n'ont pas été
fort communs. Presque tous les mal-
ades que nous avons observé
ainsi affectés, mourroient dans 24,
36 ou 60 heures, et parmi ces vic-
times il n'y avoit peu de créoles de
l'endroit, quelques étrangers, et sur-
tout un plus grand nombre de sub-
dats nés dans les régions tempérées
du Mexique, ou des particuliers ré-
cemment venus de l'intérieur.

Les cas de la seconde variété ont
été assez rares et quoique combalues
avec grand soin, les malades ont été
tôt ou tard victimes de l'épidémie.
à la mort les surprenait sans même

avoir le temps de leur porter les
secours nécessaires. Nous avons vu
plusieurs de ces malheureux donner
toutes les espérances d'une espèce de
convalescence, être tendus morts cinq
ou six heures après comme suffoqués.

Les maladies dont l'affection peut
être rapportée à la 3^eme variété ont
été fort nombreux et de plusieurs
d'entr'eux ont succombé à la maladie
on ne doit l'attribuer qu'à l'imperitie
du médecin, à l'indocilité ou au caprice
de plusieurs malades, & surtout au
manque de soins, et enfin à des cir-
constances locales qui peuvent surve-
nir même dans les affections les plus
légères et qui se présentent ici à
chaque pas. En général dans cette
variété la maladie court tous ses
pénis les qui sont plus ou moins dis-

On remarquoit trois états d'une durée plus ou
moins prolongée, permet l'application
successive de tous les secours de l'art
et si elle est fatale c'est du huitième
au 15 et même au 20 me jour. Sou-
vent au delà de cette époque l'action
est plus violente. On re-

autres variétés. C'est sans doute cette
même variété légère, qui apparaît
tous les deux jours, le jour la fièvre
est vive, le soir elle s'apaise, le
lendemain elle revient, et ainsi de
suite. C'est une fièvre intermittente
à accès courts, et à intervalles
longs. La température est élevée
à l'apogée de l'accès, et s'abaisse
à l'intermède. Les symptômes
sont ceux d'une fièvre simple,
sans complications. Le malade
est très fatigué, et a besoin
de repos. Le traitement est
symptomatique.

Cette fièvre est ^{intermittente} caractérisée par une
qualité plus ou moins aigue, la pre-
mière sans congestion cérébrale et
sans complications. Les autres
sont assez rares. La 3^{me} variété ^{ou mortelle} est
seulement grave, et la 4^{me}
est le plus souvent mortelle.

menstruation et qui par bonheur
passaient et cédèrent s'établir
pourraient être considérés comme
hors de danger. Je n'ai pu découvrir
aucun cas de mortalité dans ces cir-
constances. Enfin plusieurs femmes
enceintes ont été atteintes de la
fièvre jaune, plusieurs ont eu graves
maux même si on ne les a pas soignées.

Les enfants nouveaux nés ou ^{après} ont été aussi généralement ma-
lades que les personnes adultes et
plusieurs sont morts. Les cas graves
ou mortels ont été fort communs
chez les individus qui ont eu une
affection poitrinaire plus ou moins
avancée. Ces malades succombent
le plus souvent au 5^e ou 6^e jour.
Après les premières périodes, quelques
uns survivoient 15 à 22 jours.

Durant la convalescence de
la fièvre jaune, plusieurs malades
sont chez eux se développent des tu-
meurs inflammatoires glandulaires
qui se terminent souvent par des
pus, indurées, ou se convertissent
des fistules chroniques.

à l'usage
curatif.

Les différents systèmes
employés dans l'usage de ce
médicament sont très variés, et ont
pu d'abord reconnaître que cette affec-
tion étoit la fièvre jaune, les pre-
miers malades furent traités com-
me affectés d'une fièvre bilieuse
simple. Plus tard certains que
le typhus d'Amérique étoit l'inva-
leur on eut recours particulièrement
au méthode curatif prescrite dans
cette maladie par M^r le Doct^r
Chabert duquel on obtint des réul-
tats avantageux, modifiant ses
recettes générales suivant les tempé-
raments et la gravité des cas.
Le système purement antiphlogis-
tique dirigé par quelques pra-
ticiens d'une manière exclusive
n'a guère été satisfaisant, on en
retirait quelque avantage seule-
ment chez les individus sanguins
et seulement dans le premier
période où lorsque la gastrite
dominoit et conservoit l'équilibre
craie. Les saignées à outrance

préconisées avec tant de force
en tout par quelques médecins
de la Louisiane ne furent nullement
nécessaires ici. Par les
dats montagnais qui accompagnent
ce mémoire l'on verra qu'ayant
suivi aucun système exclusif
sa mortalité a été non seulement
plus saine que d'autres
populations on même ce fleuve.
Si le système de Brown a
été peu utile il n'a pas été de
même avec le système de Brown.
Les médecins Anglois et Amé-
ricains qui faisoient comme de
habitude usage du calomel et
du jalap. Démonstrèrent suffisam-
ment que avec leurs drastiques
ils étoient peu heureux sur la
guérison des maladies qui tomboient
entre leurs mains et firent
être forcés plus tard à modifier
leur système.

Les soldats Yucateques nés dans
l'intérieur de leur province et qui
s'indisposèrent furent peu nombreux.

Quoique presque tous des indiens
 Mayas ils se saignoient entr'eux.
 Ceux qui avoient veu sur les côtes
 plus hardis que leurs camarades
 pratiquoient sur eux une ou deux
 saignées, comme les indiens des E.
 Il. du Nord avec un morceau de verre.
 Cinq seulement de ces indiens passer-
 rent à l'hôpital militaire duquel
 ils sortirent parfaitement rétablis
 peu de jours après. Les autres au
 nombre d'environ 150 s'ils se saigni-
 rent ce fut plutôt pour tranquilliser
 leur esprit agité et parce que chez eux
 la saignée est assez habituelle.

48 (ult.)

48

#25230/293

